

Produits rappelés/touchés

Rhume et grippe-en-un Extra Fort Personnelle – Lots : 1K107B2NVR; 2D070B2QH1; 2D214B2S0F; 2G121B2U8N; 2G121B2UA0; 2G198B2UA0; 2J094B31AX

Soulagement de la grippe Personnelle – Lot : 00067288

Rhume et grippe-en-un Extra Fort Personnelle

Emballage extérieur du produit



Mises en garde figurant à l'intérieur de l'emballage extérieur du produit :

MISE EN GARDE: Consulter un médecin si les maux de gorge persistent pendant plus de 2 jours, si la fièvre dure plus de 3 jours ou les symptômes durent plus de 5 jours, si la toux s'aggrave, a tendance à réapparaître ou est accompagnée d'une forte fièvre (plus de 38 °C), ou de la production de mucosités jaune-verdâtre ou si vous faites preuve de nervosité, d'étourdissements, d'insomnie ou de réactions allergiques telles que des troubles respiratoires, des éruptions cutanées ou des démangeaisons. Consulter un médecin ou un pharmacien avant de prendre ce produit si vous prenez d'autres médicaments, y compris les produits de santé naturels, les médicaments sur ordonnance, les salicylates ou d'autres médicaments pour soulager la douleur et la fièvre (les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)), si vous souffrez d'alcoolisme chronique, d'une affection grave du foie ou des reins, de cardiopathie ou d'une maladie thyroïdienne, de pneumopathie chronique, d'hypertension, de diabète, de glaucome, ou de difficulté à uriner due à une hypertrophie de la prostate ou si vous êtes enceinte ou allaitez. Ce produit n'est pas recommandé aux patients souffrant d'asthme, d'essoufflement, ou de toux persistante et chronique, sauf sur l'avis d'un médecin. Éviter la consommation d'alcool.

EN CAS DE SURDOSE : Communiquer immédiatement avec un médecin ou un centre antipoison, même s'il n'y a aucun signe ou symptôme. Au cours des 24 premières heures, vous pourriez faire preuve d'une transpiration excessive, de nausées, de vomissements, de douleurs à l'estomac et d'une perte d'appétit.



Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Canada

Soulagement de la grippe Personnelle

Emballage extérieur du produit



Mises en garde figurant à l'intérieur de l'emballage extérieur du produit :

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES CONSOMMATEURS

AVERTISSEMENT : Consulter un médecin si la fièvre persiste pendant plus de 3 jours ou si les symptômes durent plus de 5 jours, si la toux s'aggrave, a tendance à réapparaître ou est suivie d'une forte fièvre (>38 °C) ou d'une production de mucosités jaune-verdâtre, ou en cas de nervosité, d'étourdissements, d'insomnie ou de réactions allergiques telles que des troubles respiratoires, des éruptions cutanées ou des démangeaisons. Consulter un médecin ou un pharmacien avant de prendre ce produit si vous prenez d'autres médicaments, y compris des produits de santé naturels, des médicaments sur ordonnance, des salicylates ou d'autres médicaments pour soulager la douleur et la fièvre (les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)), si vous souffrez d'alcoolisme chronique, d'une affection grave du foie ou des reins, de cardiopathie ou d'une maladie thyroïdienne, d'asthme, d'essoufflement, de toux persistante et chronique, de pneumopathie chronique, d'hypertension, de diabète, de glaucome, ou de difficulté à uriner due à une hypertrophie de la prostate, ou si vous êtes enceinte ou allaitez. Les caplets pour la nuit peuvent provoquer de la somnolence ou de l'excitabilité. Éviter la consommation d'alcool. Ne pas conduire ni entreprendre d'activités nécessitant de la vigilance. À ne pas être utilisé par les personnes âgées qui éprouvent de la confusion nocturne. Ces médicaments peuvent produire un état d'excitation plutôt que de sédation chez les personnes âgées. Leur emploi est donc à éviter parmi ce groupe d'âge.

EN CAS DE SURDOSE : Communiquer immédiatement avec un médecin ou un centre antipoison, même en l'absence de signes ou de symptômes. Au cours des 24 premières heures, vous pourriez ressentir une transpiration abondante, des nausées, des vomissements, des douleurs à l'estomac et une perte d'appétit.